

Carnimax[®] L.A.



TIERWELT[®]
MUNDO ANIMAL

Ivermectina 3.50 % L.A.

ÚNICO EN EL MERCADO CON LARGA ACCIÓN.



- ➔ Larga acción garantiza hasta 140 DÍAS en parásitos externos e internos hasta 230 DÍAS.
- ➔ Maximiza la PROTECCIÓN.
- ➔ Menos del 3.50% NO es suficiente.
- ➔ Promueve aumento en ganancia de PESO.
- ➔ Único con acción contra Amblioma Cajenense.

LABORATORIOS TIERWELT

Carrera 20 No. 194 - 65 Tel: 57 (1) 677 20 34 Fax: 57 (1) 670 47 57
www.laboratorios-tierwelt.com

Carnimax

ENDECTOCIDA DE
LARGA ACCIÓN



Endectocida de amplio espectro que contiene **Ivermectina al 3.50 %** único con larga acción, en bovinos para el control y tratamiento de nemátodos gastrointestinales, parásitos pulmonares, garrapatas, nuches, piojos y ácaros de la sarna.



VENTAJAS:

- Por su formulación es la única con larga acción.
- Su alta concentración y vehículo especial ofrecen protección hasta por:
Nemátodos gastrointestinales: 49 días.
Pulmonares y sarna: 60 días.
Garrapatas: 75 días.
Dermatobia hominis: 140 días.
- Maximiza la protección.
- Menos del 3.50% no es suficiente.
- Promueve aumento en ganancia de peso.
- Único con acción contra Amblioma Cajenense.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada ml contiene:
Ivermectina.....35 mg
Excipientes c.s.p.....1mL

DOSIS:

Usar a razón de 700 mcg/Kg, en la práctica 1ml por cada 50Kg de peso vivo.

INDICACIONES:

En bovinos, para el control y tratamiento de las infestaciones producidas por parásitos internos y externos como:

ENDOPARÁSITOS:

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* en su forma adulta y L4.

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia sumabada*, *Cooperia sp.*, *Oesophagostomum radiatum*.

ECTOPARÁSITOS:

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis var bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis* y *Chorioptes bovis*.

Garrapatas: ayuda en el control de *Boophilus microplus*.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*. Miasis causadas por *Cochliomyia hominivorax* y *Dermatobia hominis* (fase parasitaria).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

Presentaciones: Frascos por 50mL, 250mL y 500mL.
Reg. ICA No. 8091-MV

