

# Drogaxan<sup>®</sup>



TIERWELT<sup>®</sup>  
MUNDO ANIMAL

Oxitetraciclina - Diaceturato de diminazene - Antipirina - Vitamina B12

**EN LA PREVENCIÓN  
ESTA LA CLAVE.**



- ↪ Combinación ideal contra hemoparasitos.
- ↪ Recuperación máximo en 48 horas con una sola aplicación
- ↪ Favorece la rápida recuperación.
- ↪ Como preventivo en la recepción de animales.

**LABORATORIOS TIERWELT**

Carrera 20 No. 194 - 65 Tel: 57 (1) 677 20 34 Fax: 57 (1) 670 47 57

[www.laboratorios-tierwelt.com](http://www.laboratorios-tierwelt.com)

# Drogaxan

ANAPLASMOSIS, BABESIOSIS  
Y TRIPANOSOMIASIS



Hemoparasitica en solución inyectable que contiene Diminazene diaceturato, Oxitetraciclina (base), cinocobalamina y Antipirina. Indicada en el tratamiento de anaplasmosis, babesiosis y tripanosomiasis solas o mixtas en bovinos, equinos, ovinos y caninos, con efecto antipirético.

## VENTAJAS:

- Por el sinérgismo del diaceturato de diaminazene y la oxitetraciclina se logra un tratamiento total de la anaplasmosis (ranilla blanca, fiebre de garrapatas, huequera o secadera), de la babesiosis (ranilla roja, fiebre de garrapatas, hemoglobinuria o piraplasmosis) y la tripanosomiasis (secadera, mal de las caderas o renquera).
- Es una asociación de tres ingredientes indicados para obtener una acción hemoparasitica completa en bovinos, equinos, ovinos y caninos.
- Por la Antipirina actúa como antipirético y permite la disminución de la fiebre en forma rápida.
- La curación se presenta entre 24 y 48 horas después de la aplicación.
- Protege al ganado de reinfecciones de los gérmenes productores de la fiebre de garrapatas.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada ml de solución inyectable, contiene:  
Diaceturato de 4,4  
Diazaminodibenzamida.....40 mg  
Oxitetraciclina Base.....100 mg  
Antipirina.....150 mg  
Cianocobalamina.....15 mcg  
Excipientes c.s.p.....1mL

## INDICACIONES:

Para el tratamiento de Anaplasmosis bovina, babesiosis y tripanosomiasis bovina y equina, solas o asociadas.

**Bovinos:** *Babesia bigémina*, *Babesia bovis*, *Tripanosoma vivax*, *Tripanosoma Congolense*, *Tripanosoma brucei*, *Anaplasma marginale*.

**Equinos:** *Babesia equi*, *B.caballi*, *Tripanosoma evansi*, *Tripanosoma brucei*.

**Caninos:** *Babesia canis*.

**Ovinos:** *Babesia ovis*.

## DOSIS:

Se dosifica en los vacunos o equinos afectados a razón de 1mL por cada 10 Kg de peso.

En equinos dividir la dosis y aplicarle en intervalos de 1 a 2 horas para evitar síntomas parecidos al cólico.

Perros 1mL por cada 12 Kg de peso.

En Bovinos y equinos puede repetirse las dosis a las 24 horas si la fiebre persiste o a criterio del medico veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular Profunda.

**Presentaciones:** Frascos por 30mL y 100mL.  
Reg. ICA No. 8054-MV

