

Loryn[®]



TIERWELT[®]
MUNDO ANIMAL

Zeranol 1% + Ivermectina 1%

***ANABÓLICO NO ESTEROIDE
Y ANTIPARASITARIO
EN UNA SOLA APLICACIÓN.***



***Saca la cuenta ... Regalamos
el ENDECTOCIDA.***

LABORATORIOS TIERWELT

Carrera 20 No. 194 - 65 Tel: 57 (1) 677 20 34 Fax: 57 (1) 670 47 57
www.laboratorios-tierwelt.com

Loryn

**ANABÓLICO NO ESTEROIDE Y
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO**



Endectabólico, elaborado a base de ivermectina y zeranol, con un potente efecto inductor del crecimiento, gracias a la acción combinada de sus componentes. El efecto endectocida de amplio espectro de la ivermectina y el efecto anabólico específico del zeranol.

VENTAJAS:

- Permite disminuir el manejo en estrés, pues se evita el manejo innecesario en el animal al aplicar el antiparasitario y el anabólico en una sola ocasión. Esto reduce el riesgo de presentación de infecciones respiratorias por inmunodepresión causada por el estrés de un manejo violento y prolongado.
- El realizar ambas aplicaciones en un solo manejo, permite la reducción de tiempo en cuanto a maniobras para una administración más eficiente de la mano de obra, que en las fincas suele ser escasa.
- Al reducir el manejo, se reduce el contacto físico con el animal.
- Al evitar el dolor continuo, que la colocación del implante y el implante en sí implica, se favorece la reincorporación inmediata del animal al consumo de alimento.
- Al permitir una dosificación del zeranol al tamaño del animal, ofrece una mejora significativa en cuanto a la ganancia de peso, gracias al efecto anabólico que este compuesto ofrece.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada ml de ivermectina 1% + Zeranol 1% contiene:
Ivermectina.....10 mg
Zeranol.....10 mg
Excipientes c.s.p.....1.0mL

INDICACIONES:

En bovinos: en novillos de engorde, en terneros de destete, en levante y ceba, en vacas de descarte, para mejorar la eficiencia alimenticia y para el tratamiento y control de parásitos internos y externos.

PARASITOS INTERNOS:

Contra parásitos internos en forma adulta y en estado larvario de parásitos pulmonares como Dictyocaulus viviparus y gastrointestinales tales como Ostertagia ostertagi, Cooperia spp, Haemonchus plecei, Trichostrongylus spp., Nematodirus spp, Trichuris ovis y Strongyloides papillosus.

PARASITOS EXTERNOS:

LORYN es efectivo para el control y tratamiento del nuche Dermatobia hominis, piojo chupador Linognathus sp, Haematopinus sp y Solenopotes sp, ácaros de la sarna Soroptes spp, miasis por larva de Cochliomyia hominivorax y ayuda en el control de garrapata Boophilus microplus.

DOSIS:

1 ml/50 kg de peso. Repetir a los 60 ó 90 días de acuerdo al programa de engorde establecido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

Presentaciones: Frascos por 50mL, 250mL y 500mL.
Reg. ICA No. 8073-MV

